



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Своевременный уход за ушами собаки позволяет избежать многие заболевания, связанные с органами слуха. Более тщательного ухода требуют породы собак с висячими ушами, а также породы, предрасположенные к некоторым заболеваниям ушей.

Чистка ушей собаки проводится раз в неделю или 2 недели, но беглый осмотр можно проводить и чаще, например в процессе ежедневного общения и игры с домашним питомцем. Появление ушных выделений темного цвета, неприятного запаха из ушей, покраснений, шелушений, отечности или язв станут сигналом о начале возможных проблем со здоровьем – болезни ушей у собаки, которые лучше начать лечить на ранней стадии возникновения.

Гематома ушной раковины у собак

При ударе животного, сдавливании головы или во время драки с другими собаками, когда противник пытается укусить питомца в области ушей, велика вероятность образования гематомы ушной раковины у собаки. Даже частое встряхивание ушей у собак длинноухих пород может привести к гематоме.

В ушной раковине под кожей скапливается кровь, а через 2-3 дня возникает тромб. Если в травмированную область попадают микробы, начинается воспалительный процесс.

Симптомы гематомы ушной раковины у собак:

- ✓ беспокойное поведение
- ✓ собака с осторожностью трясет головой, может часто дотрагиваться лапами до больной области, расцарапывая рану
- ✓ увеличенный размер уха, утолщение ушной раковины
- ✓ на ушной раковине внутри или снаружи видна резко ограниченная, флюктуирующая, продолговатая или круглая припухлость
- ✓ если попала инфекция, начинается гнойный процесс.

Лечение гематомы ушной раковины у собак:

1. Если гематома ушной раковины у собаки обнаружена своевременно, с момента появления, необходимо уши питомца поднять на затылок и к отечной области приложить холодный компресс, а сверху закрепить давящей повязкой.
2. Начиная со 2-го дня появления гематомы, независимо от того, была ли она своевременно обнаружена или нет, к травмированной области прикладывается тепло, а не холод.
3. После компрессов на гематому наносится специальная мазь, которую посоветует ветеринарный врач.
4. Если у домашнего питомца параллельно с образовавшейся гематомой проявляются какие-либо подозрительные симптомы: потеря координации, повышенная температура, рвота или другие симптомы, животное следует как можно раньше отвезти к ветеринарному врачу.

ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

5. Если на ухе через несколько дней образуется тромб, его удаляют в ветеринарной клинике хирургическим путем и назначается ветврачом курс антибиотиков.

Гематома ушной раковины у собак излечивается обычно через 1-2 недели, если не было осложнений.

Отит у собак

Воспаление наружного уха у собак – наружный отит

У пород собак с висячими ушами и узким длинным слуховым проходом довольно часто распространено такое заболевание, как воспаление наружного уха, которое распространяется в ушной раковине на кожные покровы, а также наружный слуховой проход. Кстати, ротвейлеры, немецкие овчарки и некоторые длинношерстные породы также нередко страдают от этого заболевания из-за генетической предрасположенности.

Причины воспаления наружного уха у собак:

- ✓ гематомы ушной раковины
- ✓ попадание в ухо холодной воды, особенно во внесезонное купание на природе
- ✓ у некоторых пород собак из-за волосяного покрова, растущего в слуховом канале довольно глубоко
- ✓ паразиты: ушной клещ, педикулез, блохи и др.
- ✓ инородное тело (например, семена растений, песок, почва)
- ✓ аллергическая кожная реакция
- ✓ скопление и разложение ушной серы, своевременно не удаленной владельцем животного
- ✓ проблема, обратная предыдущей – чрезмерная чистка ушей
- ✓ бактериальная инфекция
- ✓ вирусная инфекция
- ✓ грибковое заболевание
- ✓ заболевания, связанные с иммунной системой
- ✓ эндокринные заболевания.

Симптомы воспаления наружного уха у собаки:

- ✓ беспокойное или угнетенное поведение животного
- ✓ собака трясет головой, часто чешет ухо лапой либо трется головой о предметы мебели или пол
- ✓ отказ от пищи
- ✓ наружный слуховой проход покрыт неприятнопахнущим экссудатом темного бурого или желтовато-бурого цвета
- ✓ кожа внутренней части ушной раковины воспалена, может покрыться язвочками
- ✓ если пальцами надавить на основание ушной раковины, слышно хлюпанье
- ✓ в запущенном состоянии, когда болезнь приняла хроническую форму, сужается слуховой проход, а на изъязвленных местах образуются гранулемы.

ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Как определить заболевание по цвету выделений из ушей собаки?

| | |
|--|--|
| выделения желтоватого цвета, гнойные | заболевание, вызванное грамотрицательными бактериями, такими как <i>Pseudomonas</i> |
| выделения коричневатого цвета, влажные | заболевание на фоне аллергии, вызванное стафилококковой инфекцией или дрожжевым грибом <i>Malassezia</i> |
| выделения сухие, похожие на молотый кофе | заболевание, вызванное паразитом <i>Otodectes</i> (ушной клещ) |

Лечение воспаления наружного уха у собаки:

1. Внутри ушной раковины очень аккуратно, ножницами с тупыми концами, выстригается шерсть.
2. С помощью ватного тампона, обернутого в бинт или марлю и смоченного в специальный раствор для чистки ушей собак или в 3% раствор перекиси водорода (при этом жидкости должны быть теплыми), обрабатывается слуховой проход и ушная раковина от струпьев и корок (не стоит лезть в зрительно недоступные места, чтобы не навредить животному).
3. После чистки нужно дать время обсохнуть обработанной части уха, после чего нанести преднизолоновую мазь или мазь и капли, которые порекомендует ветеринарный врач.
4. Если проведенные процедуры неэффективны по истечении нескольких дней или заболевание сильно запущено, нужно обратиться в ветеринарную клинику, где на основании осмотра и анализов ветеринар назначит радикальное лечение, например блокаду с использованием новокаина и антибиотика.

Иногда под видом воспаления наружного уха скрывается другое заболевание, вызванное дрожжевым грибом – питириспороз. Если после длительного лечения результат нулевой, стоит внимательно присмотреться к домашнему питомцу, в частности обследовать подушечки лап на предмет шелушения и наличия влажных чешуек, похожих на хлопья. Для лечения этого заболевания понадобятся фунгицидные средства.

Воспаление среднего и внутреннего уха у собак

В результате инфицирования гемолитическими стафилококками и стрептококками может возникнуть воспаление среднего уха у собаки. Воспаление внутреннего уха начинается при осложнении гнойного воспаления среднего уха. Эти болезни ушей у собак нельзя оставлять без внимания из-за серьезной угрозы здоровью животных.

Чаще всего от этого заболевания страдают шар-пеи, овчарки, мастино неаполитано и бультерьеры.

Симптомы воспаления среднего и внутреннего уха у собаки:

- ✓ угнетенное состояние
- ✓ повышение температуры тела
- ✓ понижение или отсутствие аппетита
- ✓ болезненность уха, голова наклонена в сторону больного уха



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

- ✓ из уха могут вытекать гнойные выделения
- ✓ иногда возникает рвота
- ✓ нехарактерные движения глаз
- ✓ вестибулярные нарушения
- ✓ потеря слуха на одно ухо.

Лечение:

Если вовремя не начать лечение воспаления среднего и внутреннего уха у собак, может возникнуть осложнение, представляющее угрозу жизни домашнего питомца, такое как воспаление мозговых оболочек. Поэтому самолечение в данном случае недопустимо, а при первых симптомах нужно немедленно обратиться к ветеринару.

Лечится воспаление антибиотиками широкого спектра, назначенными ветеринарным врачом, а также антигистаминными препаратами. В качестве поддержания здоровой микрофлоры кишечника назначаются соответствующие препараты.

Полезные советы:

1. Водные растворы не применяют при лечении болезни ушей у собак.
2. При серозном и гнойном отитах, на ночь уши собаки полезно прогреть синей лампой на протяжении 10-15 минут, а затем укутать уши теплым платком или шарфом. Если нет синей лампы можно использовать соль, прогрев её на сковороде и тщательно завернув в ткань. Процедура не должна вызывать у собаки дискомфорт и болезненные ощущения, для этого контролируется расстояние от лампы до уха или температура соли. После процедуры нельзя выходить на улицу или держать животное на сквозняке.
3. При отите у собаки, прогулки в холодную и сырую погоду должны быть ограничены во времени, а перед прогулкой уши собаки следует укутать и завязать теплым платком или шарфом.

Недостаточность слуха или глухота у собак

У собак может быть слабый слух, тугоухость или полная потеря слуха (глухота). Врожденная глухота чаще всего встречается у альбиносов, а также у собак с дефектами в окрасе радужной оболочки. При обследовании выявить причину глухоты практически невозможно, иногда наблюдается слабо развитый слуховой проход, щелеобразный, узкий, либо ушная раковина «слепо» оканчивается.

Причины приобретенной недостаточности слуха у собак:

- ✓ в слуховом проходе затвердела ушная смазка
- ✓ заболевание среднего и внутреннего уха
- ✓ опухоли
- ✓ инфекционные болезни, например чума
- ✓ паралич нервов уха.

Врожденную глухоту вылечить невозможно, тогда как лечение приобретенной глухоты зависит от многих факторов, прежде всего характера заболевания и степени её запущенности.