

Что делать при порезах и кровотечениях у собаки



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Приобретая домашнего питомца впервые в жизни, мало кто задумывается о том, что это живое существо может заболеть, пораниться, травмироваться. Сталкиваясь с подобными проблемами на протяжении жизни животного, владельцы накапливают драгоценный опыт, который стараются применить в будущем после покупки нового питомца или же больше не заводят животных из-за пережитого «горького» опыта. Как бы то ни было и новички и опытные владельцы собак должны знать азы оказания первой помощи.

Виды кровотечения у собак и способы остановки кровотечений

<i>вид кровотечения</i>	<i>цвет крови для данного вида кровотечения</i>	<i>сила струи</i>
капиллярное кровотечение у собак	темная кровь	на поверхности раны проступает в виде капель, либо вытекает медленной струйкой
венозное кровотечение у собак	более темный цвет крови, чем при артериальном кровотечении	струя вытекает, но не пульсирует
артериальное кровотечение у собак	алый, красный яркий цвет крови	пульсирующая, сильная струя

Как остановить капиллярное и незначительное венозное кровотечение у собаки?

Данные виды кровотечений возникают из-за порезов или в результате незначительных травм. Наилучшим способом остановить такое кровотечение будет наложение давящей повязки. Для процедуры понадобится перекись водорода (кровоостанавливающее и дезинфицирующее средство), бинт, вата, ножницы с тупым концом, которые всегда должны находиться в аптечке первой ветеринарной помощи. С помощью маленького кусочка бинта, смоченного в перекиси водорода, очищается область вокруг раны от кусочков грязи, при необходимости шерсть вокруг раны аккуратно выстригается. Небольшой отрезок стерильного бинта складывают несколько раз, смачивают в перекиси водорода и кладут непосредственно на рану, сверху прижимают слоем ваты, а затем перебинтовывают (плотно, но не слишком туго). Лапы перебинтовывают снизу вверх, каждый последующий виток бинта должен заходить на предыдущий на одну треть. Снять отечность и приглушить боль поможет холод: достаточно приложить на место ранения поверх повязки пакет с кубиками льда или замороженными овощами.

Давящую повязку можно не снимать в течение суток. Во время прогулок на лапу с повязкой надевают носок (только при сухой погоде) или специальный тапочек для собак, чтобы защитить её от загрязнений и намокания.

При смене повязки рану следует хорошо рассмотреть, обработать перекисью водорода и использовать ранозаживляющую мазь. При длительном процессе заживления, сильном воспалении и появлении гноя, лучше всего обратиться к ветеринарному врачу.

Как остановить сильное венозное и артериальное кровотечение у собаки?

Чаще всего владельцы собак сталкиваются с подобными видами кровотечений на конечностях животных. Справиться с венозным или артериальным кровотечением значительно сложнее, чем с капиллярным, для этого необходимы не только знания, но и опыт. Важно понимать саму суть данного процесса и постараться успокоиться и по возможности максимально правильно оказать помощь домашнему питомцу.

Что делать при порезах и кровотечениях у собаки



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Для остановки кровотечения в данном случае понадобится жгут (резиновый шланг, специальный медицинский жгут, эластичный бинт, тесьма или обычный носовой платок), а также стерильный бинт.

Самое главное в процессе наложения жгута - это соблюдение четырех основных правил:

1. жгут всегда накладывается выше места кровотечения;
2. сила натяжения и фиксации жгута должна быть таковой, чтобы кровотечение остановилось, однако не было перетягивания нервных стволов, что может привести к параличу конечности;
3. время, на которое можно оставить жгут: зимой – не больше 1 часа, а летом – 30 минут, при необходимости жгут можно оставить и дольше, но при этом каждые 30 минут жгут ослабляют, прижав предварительно кровоточащий сосуд пальцами, на 3-4 минут;
4. после наложения жгута животное следует немедленно доставить в ближайшую ветеринарную клинику.

Незначительные кровотечения останавливаются путем простого надавливания, тогда как сильные кровотечения требуют обязательного применения жгута. Чтобы не переусердствовать при затягивании жгута, можно воспользоваться следующим методом:

1. необходимо взять любой подходящий материал для жгута (резиновый шланг из аптечки, эластичный или обычный бинт, кусок ткани, поводок, мягкий ремень) и обернуть им место выше раны, крепко завязав узел;
2. под узел жгута подсовывают карандаш или другой подобный твердый предмет и начинают постепенно закручивать до того момента, когда кровотечение остановится;
3. карандаш привязывают другим куском бинта или ткани;
4. на место раны накладывают давящую повязку из стерильного бинта (плотно, но не туго);
5. после проведенной процедуры животное желательно напоить сладким теплым чаем или теплой водой с добавлением маленького количества соли;
6. собаку немедленно доставляют в ветеринарную клинику для оказания профессиональной ветеринарной помощи.

Полезный совет:

В мобильном телефоне должен быть внесен номер телефона круглосуточно работающей ветеринарной клиники, дежурный ветеринар которой поможет советом в оказании первой помощи и подготовится к приезду и оказанию последующей помощи травмированному животному.

Внутренние кровотечения у собак

Легочное кровотечение

Возникает в результате травм или как следствие серьезного хронического заболевания. Проявляется в виде кровотечения из носа или рта, иногда сопровождается кровавым кашлем. В любом случае животное укутывают в простынь или полотенце, чтобы ограничить движения и немедленно доставляют в ветеринарную клинику.

Кишечное кровотечение

Появляется в случае заглатывания животным острого инородного предмета, либо в результате кишечного заболевания. Проявляется кишечное кровотечение в виде дегтеобразных фекалий, а при сильном кровотечении – частое испражнение фекалиями темного цвета. В данном случае собаку нельзя кормить или давать слабительные лекарства. Единственное, что нужно сделать – это приложить холодный компресс к животу собаки и немедленно отвезти к ветеринару.

Что делать при порезах и кровотечениях у собаки



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Маточное, влагалищное кровотечение

Возникает в результате послеродовых осложнений, при воспалительных процессах и при заболеваниях половых органов. Важно обеспечить покой питомцу, положить на низ живота холодный компресс и доставить животное к ветеринарному врачу.

Кровь в моче

Появляется в результате травм области почек, мочевого пузыря или мочевыводящих путей, а также как следствие болезней органов мочевого выделения. Необходимо обеспечить покой животному, положить холодный компресс на низ брюшины или пояснично-крестцовую область и отвезти к ветеринару.