



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Эмоции, ощущения, чувства, движения, физиологические функции кошки управляются головным мозгом, при повреждении которого происходят изменения в поведении, нарушение и потеря координации, припадки, судороги, паралич или же кома.

Припадок (конвульсия) – потеря сознания, которая сопровождается следующими симптомами, которые могут проявляться выборочно при частичном припадке (без потери сознания):

- ✓ расширенные зрачки
- ✓ мышечные сокращения, происходящие произвольно
- ✓ дрожь или судороги мышц мордочки
- ✓ подергивания лап
- ✓ обильное слюнотечение
- ✓ произвольные дефекация или мочеиспускание.

Припадки у кошек могут быть приступообразными, легкими или продолжительными (более 5 минут). Некоторые припадки могут происходить настолько быстро, фактически как секундная потеря внимания, а другие – быть настоящим страшным зрелищем мучения животного.

Причины припадков у кошек:

- эпилепсия
- опухоль мозга
- повреждение мозга
- рубцовая ткань в мозгу
- гидроцефалий (в головном мозге повышенное содержание жидкости)
- в крови недостаточно кальция или сахара
- отравление ядами
- кишечный паразит лярва
- другие причины.

Эпилепсия у кошек

Эпилепсия у кошек – самая распространенная причина припадков, которая случается из-за того, что в мозгу происходят вспышки повышенной электрической активности.

Приступы эпилепсии происходят следующим образом:

1. Кошка начинает вести себя беспокойно, возрастает тревога. Животное ищет убежище для того, чтобы забиться туда и спрятаться.
2. При припадке кошка теряет сознание, при этом тело её напрягается, лапы либо ритмично подергиваются, либо резко двигаются, обильно течет слюна, зрачки расширены. Мышцы головы, век, шеи и губ судорожно двигаются. В некоторых случаях происходит произвольное мочеиспускание или же дефекация.
3. После припадка кошка некоторое время выглядит ошеломленной и не может встать на лапы.



Что делать, если у кошки припадок

Следует помнить о том, что во время припадка животное может ненамеренно искушать своего хозяина. Поэтому, оказывая помощь кошке при припадке нужно быть осторожным.

1. Основная задача владельца кошки – обеспечить безопасность животного во время припадка. Кошку относят в безопасное место, например затемненное помещение, взяв за загривок. Под голову, а также вокруг животного подкладывается что-нибудь мягкое, например сложенное в несколько раз одеяло или подушки.
2. После припадка кошку успокаивают поглаживаниями и ласковыми словами. Если припадок был длительный (более 5 минут), в течение дня лучше всего обратиться в ветеринарную клинику.
3. Когда питомец немного придет в себя, ему дают воду.
4. Нередко животное теряет на некоторое время ориентацию после припадка, поэтому его изолируют в одной комнате и наблюдают за состоянием.

Независимо от причины припадка у кошки, нужно обязательно обратиться к ветеринарному врачу для диагностики заболевания и назначения курса лечения.

Полезный совет:

Вызвать потерю сознания кошки может не только припадок, но также сердечный приступ или удар. Как распознать причину потери сознания? Обычно удар для кошки – явление крайне редкое. При сердечном приступе десны кошки будут бледными. Но в любом случае, потеря сознания кошки – обязательный повод обратиться к ветеринарному врачу.