



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Как бы мы не старались оградить домашних питомцев от ранений и травм, с животными время от времени происходят несчастные случаи. Главное, не растеряться и вовремя оказать первую помощь своему любимцу. В принципе помощь при остановке кровотечения у животного схожа с помощью, которую оказывают человеку – остановить кровь, наложив стерильную давящую повязку, рану обрабатывать антисептическим средством и перебинтовывать до тех пор, пока рана не заживет, в случае сильного кровотечения и при серьезном повреждении – обратиться к врачу.

Симптомы длительного кровотечения у кошки:

- резкое ухудшение самочувствия, вялое состояние;
- учащенное дыхание и частый пульс
- на ощупь холодные кончики ушей и конечности
- бледная слизистая ротовой полости
- иногда проявляются судорожные подергивания конечностей или мышц

Как остановить кровотечение у кошки при ранении конечностей или хвоста?

В зависимости от степени повреждений кровотечения могут быть капиллярными, венозными или артериальными.

	<i>капиллярное кровотечение</i>	<i>венозное кровотечение</i>	<i>артериальное кровотечение</i>
<i>цвет крови</i>	темный	более темный, чем при артериальном кровотечении	ярко-красный, алый
<i>напор струи при кровотечении</i>	выделяется по поверхности раны в виде капель или небольшой (вялой) струйки	струя, без пульсации	пульсирующая сильная струя

Как остановить кровь при капиллярном или небольшом венозном кровотечении?


При капиллярном или небольшом венозном кровотечении у кошек применяют давящую повязку. Для этого берут стерильную марлю или кусок стерильного бинта, складывают их в несколько раз и накладывают на рану. Если есть возможность, то кусок стерильного бинта смачивают в перекиси водорода, которая очищает рану от грязи, дезинфицирует её и считается хорошим кровоостанавливающим средством. Приложив бинт или марлю к ране, сверху нужно положить слой ваты и туго (но не очень сильно) перебинтовать. Конечности бинтуют витками, начиная с мякишей пальцев и поднимаясь виток за витком к телу, т.е. снизу вверх. Чтобы уменьшить кровоток в раненой области, сверху к перебинтованному месту прикладывают холод – пакет с замороженными овощами или грелку с ледяной водой. Уменьшить кровопотерю при повреждении конечности можно простым способом, положив кошку на спину, чтобы лапа была приподнята.

Как остановить кровь при сильном венозном или артериальном кровотечении?

В данном случае понадобится жгут, который накладывают на конечности или хвост кошки. Использовать в качестве жгута можно резиновый бинт или тонкий резиновый шланг, либо любой подручный вариант – обычный бинт, тесьму, носовой платок и др. Жгут накладывают выше места кровотечения с такой силой натяжения, чтобы кровотечение остановилось, однако не очень сильной, что может причинить боль животному. Кроме жгута на рану накладывают давящую повязку. После проведенных манипуляций кошку

ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

нужно доставить в ветеринарную клинику. В зимний период жгут можно оставить на час, а летом – на 1,5. Если необходимо больше времени, то каждые 30-40 минут жгут нужно ослабить приблизительно на 3-4 минуты, но при этом сосуд, который кровоточит, прижимают пальцами.



Если повреждены крупные сосуды, такие как бедренная артерия, то прежде чем наложить жгут и повязку, сосуды крепко пальцами прижимаются к подлежащей кости. Когда жгут и повязка будут зафиксированы, животному дают выпить теплое молоко, теплый сладкий чай или немного подсоленную воду.

Что будет, если неправильно наложить жгут и как этого избежать?

Иногда можно попасть в безвыходную ситуацию, когда при сильном кровотечении нужно наложить жгут, а владелец животного не знает, как правильно это сделать. Неправильно наложенный жгут может стать причиной перетягивания нервных стволов и как результат омертвление тканей, паралич конечности, а бездействие может привести к большой потере крови и гибели животного.



При венозном кровотечении может помочь простое надавливание пальцами (выше раны) и быстрая доставка питомца в ветеринарную клинику. Однако **при артериальном кровотечении** этого будет недостаточно. Чтобы не навредить животному, можно воспользоваться следующим методом:

- как было рассказано ранее **жгут накладывается с помощью резиновой трубки или подручных средств и крепко (но не очень сильно) завязывается на узел, затем под узел просовывается карандаш и закручивается туго до тех пор, пока кровотечение не остановится.**

Если с кровотечениями в области конечностей и хвоста более-менее понятно и можно справиться, то серьезные опасения и даже панику вызывают кровотечения внутренних органов.

Что делать, если у кошки идет кровь из носа или рта?

Если кошка упала с большой высоты или животное было сбито движущимся транспортным средством, велика вероятность того, что у него откроется легочное кровотечение. Единственный способ спасти животное – быстро доставить к ветеринарному врачу.

Иногда легочное кровотечение может открыться при некоторых хронических заболеваниях, сопровождаемых кровавым кашлем. В этом случае животному дают лекарство от кашля, поят холодной водой и отвозят к ветеринару.

Что делать при обнаружении крови в фекалиях кошки?

Кишечные заболевания, инородный острый предмет, который проглотила кошка, могут вызвать кишечное кровотечение. Несильное кровотечение проявляется в виде дегтеобразных фекалий, а сильное сопровождается частым испражнением и фекалиями темного цвета.



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

В любом случае необходимо заполнить следующие правила:

- ни в коем случае нельзя поить и кормить кошку
- нельзя давать лекарства, особенно слабительное
- нельзя ставить животному клизму

К животу и области крестца кошке прикладывают холодный компресс с помощью грелки с очень холодной водой или пакет с замороженными овощами и незамедлительно отвозят к ветеринарному врачу.

Полезные советы:

1. *не используйте в качестве повязки эластичный бинт и не перебинтовывайте рану слишком сильно, так как это может нарушить кровообращение и привести к серьезным последствиям;*
2. *чтобы защитить повязку от загрязнений на лапу можно надеть маленький (например, кукольный) носочек;*
3. *повязка меняется ежедневно, внимательно присматривайтесь к ране, если она опухает либо появляются гнойные выделения, обратитесь к ветеринарному врачу;*
4. *нередко кошки лижут повязку или разрывают её зубами, в таком случае понадобится защитный «елизаветинский» воротник.*