



Недостаточные опыт или знание, непредвиденные случаи, просто неудача могут стать причинами проблем при разведении хомячков. Детеныши могут родиться уже мертвыми, погибнуть в процессе родов или же стать жертвами нерадивой мамы.

Возможные причины рождения мертвых детенышей у здоровой самки:

- инфекция, болезнь
- неправильное питание, неполноценный рацион в период беременности
- недостаток витаминов
- недостаток в пище необходимых во время беременности микроэлементов

Нередко первая беременность заканчивается тем, что хомячиха съедает детенышей и специалисты объясняют это недостаточно развитым материнским инстинктом или тем, что самка из-за неопытности может принять своих малышей за корм. В следующий раз вероятность подобного исхода ничтожно мала и хомячиха со своими материнскими обязанностями справится скорее всего просто замечательно. Парадоксальна и та ситуация, когда малыши погибают из-за излишней заботы мамы, когда беспокоясь о безопасности потомства самочка хомячка постоянно переносит детенышей с места на место в поисках безопасного места.

Хомячки могут родиться вполне здоровыми животными и погибнуть в первую неделю жизни. И на это есть две причины:

- из-за проблем с молочной железой самка не способна полноценно накормить своих деток (недостаточное количество молока или его полное отсутствие)
- самочка неохотно кормит потомство или просто отказывается это делать

Решением проблемы с недостаточностью питания может стать искусственное кормление до тех пор, пока малыши не станут питаться самостоятельно. Для этого приобретается молочная детская смесь и хомячата кормятся из шприца без иглы или из пипетки каждые два часа, главное, чтобы напор подаваемой смеси был очень маленьким, чтобы малыш не захлебнулся. Через 10 дней в рацион хомячков постепенно вводится твердая пища – тертая морковь, проросшая пшеница. Однако в большинстве случаев такие «отказники» погибают, как ни старайся их спасти.

Иногда практикуют подсаживание детенышей к другой кормящей самочке с маленькой численностью хомячат. Однако здесь есть ряд особенностей:

- возраст хомячат не должен превышать 2-х недель
- детеныши должны содержаться в тепле
- детеныши должны иметь привычный «родной» для самочки запах

Самочка примет только теплых деток и с знакомым для неё запахом, для чего малышей предварительно натирают опилками из клетки хомячихи и хорошенько согревают. После этих манипуляций самку выманывают из гнезда с помощью любимого лакомства и с помощью ложки подкладывают малыша в гнездо, ни в коем случае нельзя брать его в руки, чтобы не оставить человеческий запах на коже.

Неполноценное питание, нехватка питьевой воды, жара в помещении, где находится клетка с беременной самкой и просто стресс могут стать причиной гибели хомячихи перед самыми родами или в самом начале кормления рожденных хомячат. Часто такое состояние называют токсикозом беременности хомяков.



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Признаки токсикоза беременности у самок хомяков:

- отсутствие или снижение аппетита
- шерсть тусклая и взъерошенная
- наблюдается спазм мышц
- слюнотечение

Попытки вылечить данную проблему в большинстве случаев оказываются неудачными. Борьба с ней необходимо изначально, обеспечив максимально комфортные условия для беременной хомячихи – постоянная влажность и температура воздуха, отсутствие сквозняков, покой и тишина, а также правильно составленный рацион и доступ к свежей, чистой воде.