



# ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Парвовирусный энтерит – это остропротекающая инфекционная болезнь, вызванная парвовирусами, которая чаще всего встречается в кишечной форме и редко в сердечной. Охарактеризовать её можно как воспаление слизистой оболочки кишечника и некроз. Парвовирусный энтерит прогрессирует очень быстро, инкубационный период – 4-6 суток, в некоторых случаях животное гибнет на 2-3-и сутки после заражения. Для людей заболевание не представляет никакой опасности

### Как собака может заразиться парвовирусным энтеритом?

- ✓ при непосредственном контакте с больным животным или собакой, перенесшей данное заболевание даже спустя длительное время
- ✓ контакт здорового животного с почвой, которая загрязнена выделениями больного животного
- ✓ использование игрушек и предметов ухода за собакой, которая болеет или болела парвовирусным энтеритом
- ✓ употребление корма из одной миски зараженным и здоровым животным

Очень важно распознать первые признаки заболевания в самом начале, фактически в первые часы после заражения, а не на второй-третий день, как часто это бывает, когда состояние животного можно охарактеризовать как близкое к критическому.

### Симптомы кишечной формы парвовирусного энтерита у собак:

- ✓ первые клинические признаки проявляются потерей аппетита, апатией, быстрой утомляемостью
- ✓ иногда наблюдается напряженность живота и болевая чувствительность при пальпации
- ✓ появляется сильная рвота, часто бывает с примесью желчи и слизи
- ✓ у животного наблюдается сильная жажда, собака пьет много и с жадностью, а затем сразу же начинается рвота
- ✓ затруднения при мочеиспускании отмечают в большинстве случаев
- ✓ через сутки после рвоты начинается диарея, при этом зловонные массы отличаются желтым, зеленоватым, темным красным или ярким фиолетовым цветом, может присутствовать небольшое количество крови
- ✓ может повышаться температуры тела, чаще незначительно, до 1 градуса
- ✓ происходит обезвоживание организма

### Какие животные находятся в зоне риска?

- парвовирусным энтеритом домашние животные болеют независимо от пола и породы
- в зоне наибольшего риска находятся щенки 2 и 2,5 месячного возраста и животные в возрасте до 2-х лет

### Как лечится парвовирусный энтерит у собак?

1. При первых подозрениях инфицирования парвовирусным энтеритом, животное необходимо только поить, при этом лучше использовать слабый раствор «Регидрона». Кроме того собаке нужно сделать клизму, добавив полисорб в 100-500 мл. теплой воды (в зависимости от размера собаки), это поможет снять болевой синдром.
2. Необходимо как можно быстрее отвезти питомца в ветеринарную клинику, где ветеринарный врач распишет схему лечения, которая часто включает специальные сыворотки и глобулины, антибиотики, фоспренил, гамавит и противорвотные препараты.
3. В период выздоровления животному могут назначить лекарственные препараты для восстановления микрофлоры и нормальной работы кишечника, а также специальную диету и витаминно-минеральные подкормки.



# ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

4. В качестве дополнения к основному лечению, по рекомендации ветеринара, можно применять фитотерапию или гомеопатию. Для этого готовятся отвары из ромашки, календулы и зверобоя, при этом отвары чередуются с полисорбом.

### Последствия и осложнения у собак, которые переболели парвовирусным энтеритом:

- у взрослых собак какие-либо осложнения проявляются редко
- щенки после перенесенной болезни могут отставать в росте
- может развиться глухота
- у инфицированных беременных самок может случиться аборт, могут родиться мертвые щенки или щенки с аномалиями
- у больных кобелей часто развивается аспермия (отсутствие спермы)

Существует только один эффективный способ избежать болезней - парвовирусный энтерит у собаки – это своевременно и правильно вакцинировать животное.