

## Как оказать первую помощь кошке при травмах и несчастных случаях



# ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Домашние кошки получают травмы значительно реже бродячих животных, но всё же не всегда удается избежать их, как в прочем и несчастных случаев. Нередко можно услышать, как животное выскакивает на балкон или окно и срывается с верхних этажей вниз. Невозможно предупредить все несчастные случаи и оградить от них домашнего питомца. Просто нужно быть готовым к любым ситуациям и в нужный момент не растеряться, своевременно оказать первую помощь кошке. В большинстве случаев умелые действия хозяина по оказанию первой помощи предотвращают гибель любимого питомца.

### Как оказать первую помощь кошке при несчастном случае?

- 1) Самое главное – соблюдать спокойствие, по возможности объективно оценить состояние питомца и оказать ему первую помощь. При этом действовать нужно спокойно, без паники, ласково разговаривая с животным.
- 2) Первое что нужно сделать – ограничить кошку в движениях, для этого животное можно завернуть в ткань или полотенце, предварительно проверив дыхание и пульс.
- 3) Следующий шаг – оценить внешние видимые физические повреждения – сломанные конечности, раны. Делать это нужно с осторожностью, так как кошка из-за испытываемой боли может быть непредсказуемой: кусать, царапать, вырываться.
- 4) Следует помнить, что после несчастного случая кошка может вести себя как обычно, но при этом находиться в шоковом состоянии, что влечет за собой смертельную угрозу. Поэтому животное в любом случае необходимо как можно быстрее доставить в ветеринарную клинику.

### Как проверить дыхание кошки?

Количество дыхательных движений взрослой кошки составляет приблизительно - 30 в минуту. Если число значительно превышает норму, значит животное испытывает боль, находится в шоке или произошли нарушения в работе легких и сердца. Тяжелое и частое дыхание у кошки может свидетельствовать о боли или подъеме температуры тела. Если дыхание не прослушивается и кошка находится без сознания, нужно сделать искусственное дыхание.

### Как измерить пульс кошке?

Для взрослой кошки нормой считается частота сердцебиения – 120 ударов в минуту и немного выше, для котят – 200. Если животное пугается, то пульс учащается до 200 ударов. Частое сердцебиение возникает при боли, в начальной стадии шокового состояния, а также при высокой температуре, лихорадке.

### Прощупать и подсчитать пульс у кошки можно двумя способами:

- 1) Приложить пальцы руки (кроме большого) к груди кошки позади локтей и понемногу надавливать, пока не ощутится биение.
- 2) У толстых кошек прощупать пульс первым способом скорее всего не удастся, а вот второй способ самый распространенный и надежный. Для этого необходимо нащупать у кошки бедренную артерию, в месте соединения внутренней части задней лапы с туловищем, другими словами в паховой области. Животное часто бывает беспокойным, поэтому пульс считают на протяжении 15 секунд, а затем умножают на четыре.

Если пульс не прощупывается в бессознательном состоянии животного, нужно применить непрямой массаж сердца.

## Как оказать первую помощь кошке при травмах и несчастных случаях



# ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

### Как оказать первую помощь кошке при травмах?

Существует множество видов травм, которые могут получить кошки в различных жизненных ситуациях. Самые частые из них будут представлены ниже, а также описаны симптомы и признаки, а также методы оказания первой помощи кошке в каждом случае.

<i>травма</i>	<i>симптомы и признаки</i>	<i>оказание первой помощи</i>
вывихи конечностей	<ul style="list-style-type: none"><li>- животное избегает наступать на вывихнутую конечность, при этом мяукает от боли;</li><li>- заметна деформация и отечность травмированного сустава;</li><li>- неестественное положение травмированной лапы</li></ul>	отвезти кошку в ветеринарную клинику для того, чтобы ветеринар вправил вывих. После этого накладывается тугая повязка. Главный успех выздоровления – покой и ограничение физических нагрузок
ушибы конечностей	<ul style="list-style-type: none"><li>- животное избегает наступать на ушибленную конечность;</li><li>- разрыхленная ткань вокруг ушибленной области</li></ul>	к ушибленной области прикладывают холодный компресс (можно использовать пакет с замороженными овощами), а потом накладывают давящую повязку
растяжение сухожилий или связок	<ul style="list-style-type: none"><li>- болевая реакция при пальпации, а также во время движения животного</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) сразу же после получения травмы прикладывается холодный компресс;</li><li>2) последующие компрессы должны быть только согревающими;</li><li>3) укутывание теплым платком;</li><li>4) массаж</li></ol>
травмы головного и спинного мозга при падении с высоты	<ul style="list-style-type: none"><li>- неуверенная, шатающаяся походка;</li><li>- учащенный пульс (реже замедленный);</li><li>- расширенные зрачки;</li><li>- побледнение слизистой конъюнктивы и рта;</li><li>- дыхание с хрипами;</li><li>- рвота;</li><li>- недержание мочи, паралич задней части туловища при ушибе спинного мозга;</li><li>- параличи</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) при ушибе головного мозга – к голове прикладывают лед или пакет с замороженными продуктами и доставляют к ветеринару;</li><li>2) при травме спинного мозга – животное заворачивают в одеяло или полотенце и немедленно доставляют в ветеринарную клинику</li></ol>
переломы	<ul style="list-style-type: none"><li>- сильная болевая реакция;</li><li>- при закрытом переломе область в месте повреждения отекает;</li><li>- при открытом переломе видна кость в месте разрыва ткани;</li><li>- травматический шок;</li><li>- при переломе позвоночника: изогнутая спина, боль при прикосновении к области спины;</li><li>- парализация животного</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) в случае закрытого перелома, травмированную конечность фиксируют к твердому предмету, на пример доске с помощью бинтов или ткани;</li><li>2) в случае открытого перелома, на рану накладывают стерильную повязку, а затем фиксируют как в первом случае;</li><li>3) в случае перелома позвоночника – для фиксации полотенце оборачивают вокруг шеи кошки, а затем, не сгибая её спину, аккуратно перетаскивают на плоскую доску и привязывают при помощи лоскутов ткани;</li></ol>

## Как оказать первую помощь кошке при травмах и несчастных случаях



### ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

		4) животное немедленно доставляют в ветеринарную клинику
травмы глаз	частое моргание и прищуривание может возникнуть из-за попадания в глаз инородного тела	- приподнять верхнее и опустить нижнее веко пальцами для осмотра глаза на предмет попадания инородного тела; - если таковое имеется, промыть глаз теплой водой или убрать его чистым влажным ватным тампоном
	ранения век в результате драки: припухлость, разрыв ткани, кровь	к глазу прикладывают холодный компресс на 20-30 минут. Если появляются выделения, глаза промываются теплой водой, специальным средством для глаз, а затем не лишним будет консультация ветеринарного врача
	глаз выступает из орбиты	намочить чистую ткань в соленой теплой воде и накрыть ею глаз, затем не туго прибинтовать к голове, срочно отвезти питомца к ветеринару