

## Как предупредить нежелательную беременность кошки



# ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Проблема беспризорных животных возникает из-за бесконтрольного размножения кошек. Домашние питомцы чаще всего находятся под наблюдением хозяев, которые не допускают ненужного появления на свет котят.

Однако они сталкиваются с другими проблемами – агрессивное поведение, постоянное мяуканье, переходящее в завывания и даже крик, разбрызгивание мочи по всей территории квартиры или дома.

Предупредить нежелательную беременность у кошки можно двумя способами:

### **Химический способ (лояльный, но не всегда действенный)**

Подходит в том случае, если у владельцев кошки появится желание обзавестись в будущем потомством от своей домашней любимицы. Он предполагает прием контрацептивных таблеток или капель несколько раз в месяц или же уколы с противозачаточными средствами каждые 4-6 месяцев. Действие таких препаратов заключается в том, чтобы понизить половое возбуждение с контрацептивным эффектом. Но некоторые кошки плохо переносят такие препараты, а иногда они просто противопоказаны из-за проблем со здоровьем. Поэтому, прежде чем дать такую таблетку своей любимице нужно проконсультироваться у ветеринарного врача по поводу наиболее подходящего препарата и общего состояния здоровья кошки.

### **Хирургический способ (сложный, но высокоэффективный)**

Если в планы хозяев не входит разведение кошек, то самым эффективным способом будет – стерилизация. Процедура стерилизации кошки более сложная, чем кастрация котов. Раньше она заключалась в перевязывании фаллопиевых труб, в последнее время предпочтение отдается удалению яичников. Операцию желательно проводить в возрасте 6-7 месяцев (в некоторых источниках 8-10 месяцев), до первой течки. В любом случае, по поводу проведения процедуры стоит заранее проконсультироваться с ветеринарным врачом. Операция проводится под общей анестезией, занимает длительный промежуток времени, но считается не опасной.

Первое условие успешного проведения операции – здоровое животное. Второе – перед операцией нельзя кормить кошку приблизительно 18 часов. Поить животное можно без ограничений, но только водой, а не молоком.

### **Отрицательные моменты после проведения процедуры стерилизации:**

- Многих владельцев прооперированных кошек пугает широкий шрам, который остается после операции на животе. Не нужно переживать, домашние питомцы очень быстро восстанавливаются, рана заживет достаточно быстро и на животе через несколько недель отрастет новая шерсть.
- Стерилизация кошек может стать причиной развития склонности к ожирению. Часто так и происходит. Решить эту проблему вполне реально, если следовать простым рекомендациям – правильное питание, специальные диетические корма, подвижные игры, частые прогулки.

### **Положительные моменты после проведения процедуры стерилизации:**

## Как предупредить нежелательную беременность кошки



### ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

- возможность избежать криков, назойливого мяуканья, бессонных ночей и порчи имущества
- нет необходимости беспокоиться о питомице в процессе родов, ухаживать за новорожденными котятами и пристраивать их потом в хорошие руки
- ласковый и покладистый характер
- значительно уменьшается риск заболеть половыми инфекционными заболеваниями или раком молочных желез
- увеличивается продолжительность жизни