



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Пройдя беспокойный путь спаривания и беременности, перед владельцем животного возникает новая проблема – роды кошки. Многие случаи заканчиваются вполне удачно, владельцы находят своих питомцев с вполне здоровым и довольным потомством. Но не стоит полагаться на счастливый случай и всё же по возможности подготовиться к родам кошки

Как определить приближение родов у кошки по поведению и внешним признакам?

- ✓ кошка становится раздражительной, нервной, беспокойной
- ✓ движения становятся неуклюжими и трудными для питомицы
- ✓ в предродовой период кошки ведут себя по отношению к хозяевам по-разному – одни животные ищут уединения, не желая, чтобы их беспокоили, другие – наоборот, ластятся к хозяевам, постоянно ищут с ними контакта
- ✓ животное жалобно мяукает или издает мурлыкающе-ритмичные звуки
- ✓ при пальпации живота кошки ощущаются уплотнения кожи
- ✓ кошка очень часто уделяет внимание чистоплотности, особенно тщательно
- ✓ вылизывая гениталии и живот
- ✓ животное отказывается от еды
- ✓ в ящике, подготовленном для родов, кошка начинает рвать или царапать бумагу
- ✓ появление выделений из влагалища, выступающее молозиво на сосках, частое мочеиспускание и понижение ректальной температуры свидетельствуют о том, что роды у кошки начнутся в ближайшее время.

Как максимально точно определить время родов у кошки?

Если спаривание животных было плановым и протекание беременности было удачным, то на 61-й день вынашивания кошке необходимо начать измерять ректальную температуру. Если во время беременности ректальная температура имеет высокие показатели, где-то 38,4-38,9 градусов Цельсия, то её падение ниже 37,5 градусов Цельсия возвестит о начале родов в ближайшие 24 часа, но обычно не ранее чем через 12 часов. В некоторых случаях роды могут начаться при нормальных показателях температуры тела.

Продолжительность беременности зависит от многих факторов – состояния здоровья животного, породы, особенностей протекания беременности и т.д. Поэтому роды могут начаться с 61-го по 70-й день со дня спаривания. В большинстве случаев – 63-й день при нормальной беременности.

Как протекают роды у кошки?

Схватки у кошки начинаются приблизительно за час до того, как появится первый котенок. Выделение слизи из влагалища сигнализирует о начале процесса рождения. Первый котенок появляется через 15 минут после начала родов, а остальные при нормальном течении родов появляются обычно с интервалом от 5 минут до получаса.



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Положение кошки во время родов может быть разным, она самостоятельно выбирает для себя наиболее удобный вариант:

- лежа на боку
- присев на корточках
- стоя

Роды кошки продолжаются в среднем от двух до шести часов. Иногда процесс прерывается (до суток). Тогда животное ведет себя вполне нормально, ухаживая за уже родившимися котятами, а через несколько часов роды возобновляются.

Процесс родов кошки можно разделить на три этапа:

<i>Характеристика этапа</i>	<i>Описание процесса, поведение кошки</i>	<i>Действия хозяина кошки</i>
1 ЭТАП		
Раскрытие шейки матки, родового канала	<p>Поведение кошки: учащенное дыхание беспокойство возможна дрожь тела смена положения тела, похожее на то, что кошка хочет прикусить хвост может начаться выделение молока из сосков кошка тужится, жалобно мяукает или ритмично мурлыкает.</p> <p>Сокращаются мышцы живота, в результате чего котята проталкиваются из рогов матки к телу, затем к шейке и во влагалище</p>	<p>На данном этапе помощь хозяина не требуется, если только поведение животного не вызывает опасения.</p>
2 ЭТАП		
Рождение котенка	<p>Появление между губами вульвы плодного пузыря (мешка) с детенышем. При разрыве плодного мешка амниотическая жидкость выливается, помогая прохождению плода и через несколько минут рождается котенок.</p> <p>Кошка освобождает малыша от околоплодного мешка и вылизывает котенка, особенно рот и нос, стимулируя дыхание.</p> <p>Через 15 минут кошка перегрызает</p>	<p>1. Если плодный мешок из-за сильных потуг разорвался в родовых путях, то велика вероятность угрозы жизни котенка. Особенно при затягивании появления его на свет более получаса.</p> <p>2. При рождении обычное положение котенка – вперед головой и передними лапками. Если же предлежание ягодичное, то понадобится помощь хозяина или ветеринара. Для этого чистой мягкой тряпкой обхватывают тельце котенка (ни лапы и ни хвост!) и в такт схваткам двигают малыша очень осторожно на себя.</p>



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

	<p>пуповину.</p>	<p>3. При нормально протекающих родах с каждой потугой видно как тельце котенка продвигается вперед, обычно сначала появляется мордочка и передние лапки, иногда малыши идут задними лапками. В любом случае не должно быть никаких обратных движений, котенок должен продвигаться только вперед.</p> <p>4. В некоторых случаях во время родов происходит аномалия отслойки плаценты, когда котенок рождается, а плацента не выходит. Это становится причиной невозможности рождения остальных котят. В таком случае хозяину кошки придется её вытащить, захватив стерильной салфеткой, делать это нужно очень аккуратно.</p> <p>5. При быстропротекающих родах, когда кошка не успевает освободить от оболочки всех родившихся котят, это должен сделать хозяин, быстро её удалив.</p> <p>6. Важно проследить как кошка будет перегрызать пуповину, расстояние от разгрызенного места до животика малыша должно быть не менее 2,5-4 см, чтобы не началось кровотечение или не образовалась пупочная грыжа. Если же началось кровотечение, то владельцу нужно пупочный канатик перевязать чистой ниткой и прижечь йодом, 5% раствором прополиса или другим антисептическим средством.</p>
<h3>3 ЭТАП</h3>		
<p>Выход (рождение) последа</p>	<p>После рождения котенка происходит отделение и рождение плаценты, которую кошка съедает.</p> <p>Определить, что послед отделился полностью можно по выделениям, которые имеют темный красный или коричневатый-красный цвет. Иногда, такие выделения могут свидетельствовать и о наличии погибшего плода в матке.</p> <p>После рождения всех котят кошка ложится на бок для того чтобы накормить малышей молозивом, основным источником питания и антител.</p>	<p>Многие хозяева не разрешают кошке съедать последа. Однако в последе есть вещества полезные для здоровья кошки. Поэтому каждый владелец животного решает сам – позволить кошке съесть послед или только его часть или же вообще выбросить.</p> <p>Если последов слишком много, то кошка естественно не сможет все их съесть, поэтому хозяину необходимо будет убрать остатки.</p> <p>Некоторые заводчики советуют давать съесть кошкам не более одного или двух последов, так как поедание большого количества последов может привести к рвоте и поносу, как у кошки, так и у малышей.</p> <p>Важно отследить появление всех последов, число которых должно соответствовать количеству родившихся котят. Если послед не отошел, остался внутри кошки, это может стать причиной воспаления матки или распространения инфекции.</p>



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Что нужно сделать сразу после родов кошки?

1. Поставить рядом с местом родов воду, корм и туалет, чтобы кошке не пришлось уходить далеко от котят.
2. Вымыть и вычистить всё после родов.

Делают ли кесарево сечение кошкам?

Кесарево сечение делают кошкам в том случае, если плод не соответствует размерам родовых путей или более понятными словами – кошка не может разродиться самостоятельно. Проблема эта возникает из-за недосмотра хозяев животных, когда кошки во время сезона «спариваний» сбегает из дома или из-за незнаний хозяев животных, когда спаривание происходит по сценарию «какой у вас огромный кот, а у меня есть миленькая кошечка». Размер самца, значительно превышающий размер самки приводит к тому, что размер плодов будет больше, чем предусмотрено породой кошечки, она не сможет самостоятельно родить котят, а значит, потребуются хирургическое вмешательство, чтобы спасти жизнь животного.

Кроме вышеперечисленных распространенных случаев у кошки во время родов могут возникнуть и другие проблемы, так называемые неправильно протекающие или патологические роды.

Причины патологических родов:

- узкий таз
- перелом костей таза в прошлом
- спонтанное нарушение мышц брюшной стенки и сократительной способности матки
- неправильное расположение плодов, поворот головы плода, крупный плод
- старость животного
- ожирение кошки и др.

Эффективность операции зависит от своевременности поставленного диагноза. Поэтому кошку во время беременности необходимо приносить на прием к ветеринарному врачу для регулярных осмотров и проведения ряда анализов. От этого зависит здоровье питомицы и плодов. Кроме того ветеринар даст подробные рекомендации по уходу и питанию кошки.

После проведения кесарева сечения у кошки за ней придется ухаживать более тщательно, чем за животным с нормальным родовым процессом. Обычно послеоперационный уход включает в себя следующее:

- введение антибиотиков внутримышечно и других лекарственных средств, назначенных ветеринаром
- особый режим питания, рекомендованный ветеринарным врачом
- регулярная обработка раны, оставшейся после операции
- доставка кошки в ветеринарную клинику для снятия кожных швов, обычно на 10-й – 14-й день после операции



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

Сколько бы ни было дано рекомендаций, случаев осложнений и проблем бывает множество и не со всеми может справиться владелец животного. Пусть для этого он прочитает множество литературы и будет эмоционально спокоен, присутствуя при родах питомицы. Если хозяину не безразличны здоровье и жизнь домашней любимицы и будущего потомства, лучше всего прибегнуть к консультации и помощи квалифицированного ветеринарного врача!