



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

В большинстве случаев при нормально протекающей беременности и правильном уходе кошки справляются с родами самостоятельно, а вмешательство хозяина может изрядно раздражать животное, из-за чего кошки иногда съедают детенышей.

В экстренных случаях в процессе родов кошке может потребоваться помощь хозяина, а иногда и ветеринарного врача.

<i>Проблемы и осложнения при родах</i>	<i>Оказание помощи кошке при родах</i>
<p>Котенок очень крупный, во время родов застрял во влагалище, только при сильных схватках на время появляется головка и небольшая часть туловища</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Смажьте снаружи родовые пути вазелином и подождите минут 10-15, возможно это поможет выйти малышу наружу самостоятельно.2. Если первый вариант не помог, наденьте стерильные перчатки, возьмите в руки чистую стерильную ткань и сделайте следующее:<ul style="list-style-type: none">- во время очередных потуг, когда головка котенка появится в петле вульвы, прижмите промежность прямо под анальным отверстием в направлении вниз, это поможет удержать головку малыша и не дать ему снова уйти в родовые пути;- обхватите котенка стерильной тканью за кожу в области спинки или холки, ни в коем случае нельзя хвататься за голову или лапки и очень осторожно вытяните его наружу;- иногда малыша вытянуть очень трудно, возможно дело в согнутой конечности, тогда тело малыша легко раскачивают очень медленно в одну и в другую сторону, а затем аккуратно вытаскивают.3. Если при родах показываются сначала лапки, заклиниваясь в родовых путях, то хозяину придется очень аккуратно втолкнуть их обратно в тело матери, чтобы котенок поменял положение и появился нормально при следующих схватках.
<p>Роды у кошки проходят стремительно, и она не успевает освободить всех малышей от амниотического мешка, который должен быть вскрыт в течение 30 секунд после появления котенка на свет</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Действия проводятся в стерильных перчатках. Разрывают зародышевую оболочку по направлению от носика и вдоль тела.2. Глазной пипеткой очищают пасть и нос котенка от слизи, чтобы он мог сделать первых вдох.3. Носовые ходы котенка заполнены амниотической жидкостью, которую следует удалить. Для этого малыша аккуратно кладут на



ШПОРГАЛКИ по уходу за домашними животными

	<p>ладонь, фиксируют голову, а затем резко переворачивают хвостиком вверх.</p> <p>4. После того как малыш начинает самостоятельно дышать, его аккуратно растирают мягкой стерильной тканью и подносят к кошке, чтобы она обнюхала малыша, облизала и приступила к кормлению.</p>
<p>В результате затяжных родов котенок может родиться ослабленным, не способным самостоятельно дышать</p>	<p>1) удалив слизь из носа и рта котенка при помощи пипетки, аккуратно возьмите малыша головой вниз (придерживая голову) и аккуратно встряхните его, одновременно легко надавливая на грудную клетку. Встряхивания можно чередовать с искусственным дыханием, но не дольше чем 3 минуты.</p> <p>2) если не помогло встряхивание, малыша можно попробовать откачать: указательным и большим пальцем очень аккуратно сдавливают грудную клетку котенка по направлению от груди к спине, отсасывая пипеткой жидкость из носа после нескольких движений;</p> <p>3) если малыш не дышит, ему придется сделать искусственное дыхание, вдохнув совсем чуть-чуть воздуха через носик и ротовое отверстие (если сделать сильный вдох, легкие котенка могут разорваться), выдох будет самопроизвольным. Действие продолжают до момента, когда малыш начнет дышать самостоятельно;</p> <p>4) промокнув насухо тело котенка чистым полотенцем, его можно положить на время в отдельную коробку с грелкой, чтобы он быстрее согрелся.</p>

В каких случаях потребуется помощь ветеринарного врача во время родов кошки?

1. на боках животного мышцы сокращаются с регулярным интервалом, прошло несколько часов с момента наступления родов, а котят не появляются;
2. после отхода вод прошло 4-6 часов, а кошка не может родить первого котенка;
3. кошка начинает постепенно терять силы, ослабевать;
4. промежутки времени между рожденьями малышей возрастают до 3-х часов и более при том, что кошка всё пытается разродиться;
5. роды еще не завершились, а схватки ослабели или вовсе прекратились;
6. во время родов или после них началось кровотечение, не прекращающееся 10 минут;
7. температура тела резко повысилась выше 40 градусов Цельсия или наоборот упала ниже 36 градусов Цельсия, возможно у животного инфекционное заболевание, особенно в совокупности с безучастным состоянием и слабостью;
8. после родов кошка не находит себе места, постоянно передвигается, беспокоится или наоборот, очень вялая и слабая (обычное состояние после родов у кошки – спокойное, она кормит малышей и ухаживает за ними);
9. если после родов истечения из влагалища не прекращаются через 7 суток, или на протяжении этого времени имеют необычный цвет – яркий алый или гнойный.